



*Catálogo
de Productos*

ATRAMYL 90 WG

ATRAZINA 90% - WG

Bolsa de 15 Kg.

Clase Tox. IV

Herbicida sistémico selectivo de actividad residual. Controla malezas anuales de hoja ancha y angosta en pre-emergencia y post-emergencia temprana del cultivo. Recomendado en maíz, caña de azúcar y sorgo.

G66GLIFOSATO (Sal Potásica) 66,2%
(eq. ác. 54 %) - SL

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. IV

Herbicida sistémico no selectivo de uso postemergente de amplio espectro.

CAMARADE MYL

DICAMBA 57,8% - SL

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. IV

Herbicida sistémico hormonal post-emergente. Controla malezas de hoja ancha. Recomendado para barbechos químicos, cereales de invierno, maíz y sorgo.

GENSAFEN

FOMESAFEN 25% - SL

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. IV

Herbicida de contacto postemergente para el control de malezas de hoja ancha en soja, poroto y maní.

GLYNOMYL FULLGLIFOSATO (Sal Potásica) 88%
(eq. ác. 71,8%) - SG

Bolsa de 15 Kg.

Clase Tox. IV

Herbicida sistémico no selectivo de uso postemergente de amplio espectro. Glynomyl Full es el único glifosato potásico granulado con la más alta concentración.

GLORIUS MYL

PICLORAM 27,8% - SL

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida hormonal sistémico postemergente. Controla malezas de hoja ancha anuales y perennes en cultivos de invierno, caña de azúcar, sorgo y maíz.

GUERRER MYL

SULFENTRAZONE 50% - SC

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida sistémico residual de uso pre-emergente. Recomendado para barbechos químicos en cultivos de soja, girasol y maní.

HALOXIGEN PLUS

HALOXIFOP 93,5% - EC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. II

Herbicida sistémico post-emergente para el control de malezas de hoja angosta anuales y perennes. Recomendado en barbechos, cultivos de hoja ancha y maíces Enlist.

FENOMYL 30 ME

2,4-D 30% - ME

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. II

Herbicida sistémico hormonal post-emergente. Recomendado para el control de malezas de hoja ancha en barbechos químicos.

HELIOS PLUS

GLUFOSINATO DE AMONIO 60% - SL

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida de contacto y sistemía reducida de uso postemergente. Recomendado para barbechos y cultivos tolerantes. Registrado en soja y maíces de tecnología Enlist.

MESOMYL

MESOTRIONE 48% - SC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida sistémico residual, selectivo para el cultivo de maíz. Recomendado para el control de malezas latifoliadas, y algunas gramíneas, en preemergencia y postemergencia temprana.

PATTERN

S-METOLACORO 96% - EC

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida residual sistémico de uso en preemergencia para el control de malezas de hoja angosta y algunas dicotiledóneas en diversos cultivos.

PINOXAMYLPINOXADEN 5%
+ CLOQUINTOCET 1,25% - EC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. IV

Herbicida postemergente sistémico selectivo especialmente diseñado para el control de raigrás y avena negra en cultivos de trigo y cebada.

PRONTOGEN MYLS- METOLACORO 51,8%
+ FOMESAFEN 1,2% - EC

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha. Recomendado en pre-emergencia y post-emergencia del cultivo de soja.

TECNOFLUMYL

FLUMIOXAZIN 48% - SC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. IV

Herbicida de acción residual en suelos para el control preemergente de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas. Recomendado en diversos cultivos en aplicaciones de presembrado y preemergencia.

TECNOSULFONE MYL

PYROXASULFONE 85% - WG

Bolsa de 5 Kg.

Clase Tox. IV

Herbicida preemergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en los cultivos de trigo, cebada, soja y maíz.

TODYM PLUS

CLETODIM 48% - EC

Bidón de 20 Lts.

Clase Tox. III

Herbicida sistémico post-emergente para el control de malezas de hoja angosta anuales y perennes. Recomendado en barbechos y cultivos de hoja ancha.

TRENCH 84 WG

DICLOSULAM 84% - WG

Bolsa de 500 g.

Clase Tox. IV

Herbicida sistémico residual para el control de malezas de hoja ancha en la pre-sembrado y pre-emergencia de cultivos de soja y maní.

BENZOMYL EMA

BENZOATO DE EMAMECTINA 25% - SL

Botella de 1 Lt.

Clase Tox. II

Insecticida de la familia de las avermectinas, especialmente diseñado para el control de lepidópteros. Actúa por contacto e ingestión. No afecta a la fauna benéfica.

BENZOMYL PLUSBENZOATO DE EMAMECTINA 10%
+ LUFENURÓN 40% - VG

Bolsa de 1 Kg.

Clase Tox. II

Insecticida que combina la acción neurotóxica del Benzoato de Emamectina; y de Lufenurón, que actúa como regulador del crecimiento. Especialmente diseñado para el control de orugas defoliadoras en soja y oruga cogollera en maíz, con muy buena capacidad de volteo y persistencia.

CLORANTRAMYL

CLORANTRANILIPROLE 40% - SC

Botella de 1 Lt.

Clase Tox. IV

Insecticida foliar de la familia de las diamidas antranílicas. Diseñado para el control específico de lepidópteros sin efecto sobre fauna benéfica. Posee acción sistémica y residual.

FENT IO

BIFENTRIN 10% - EC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. II

Insecticida piretroide de acción por contacto e ingestión. Controla insectos chupadores y masticadores en distintos cultivos.

HACKERTIAMETOXAM 14,1%
+ LAMBDAALOTRINA 10,6% - ZC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. III

Insecticida foliar de amplio espectro. Acción sistémica, de contacto e ingestión. Se caracteriza por su buen poder de volteo y persistencia de control.

HACKER TOP

TIAMETOXAM 30% + BIFENTRIN 20% - SC

Botella de 1 Lt.

Clase Tox. II

Insecticida foliar de amplio espectro, integrado por Tiametoxam, neonicotinoide sistémico de alta residualidad que controla insectos chupadores; y Bifentrin, piretroide de alto poder de volteo que controla insectos de un amplio espectro.

KWONDUS MYL

LAMBDAALOTRINA 25% - CS

Botella de 1 Lt.

Clase Tox. IV

Insecticida piretroide banda verde de amplio espectro de control con buena capacidad de volteo y persistencia debido a su formulación como microencapsulado.

GENESIS DUOAZOXISTROBINA 20%
+ CYPROCONAZOLE 8% - SC

Bidón de 5 Lts.

Clase Tox. III

Fungicida sistémico que combina la acción preventiva y antiesporulante de Azoxistrobina, con el efecto curativo y erradicante de Cyproconazole. La mezcla de ambos activos asegura un amplio espectro de control de enfermedades durante un período prolongado de tiempo y reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes.



Crecemos en la misma tierra.

MIRÁ TODOS NUESTROS PRODUCTOS

www.tecnomyl.com.ar

